1

Es sei die kubische Gl. $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ gegeb.
man setze $x = \frac{y}{3} + \frac{p}{3}$ dann hat die 2te Glied hinweg
zu schaffen; so erhält man

$$y^3 - 3p^2y - 2p^3 + 9qy + 9pq = 0$$
$$-27r$$

der kurze halber setze

man $3p^2 - 9q = q$, $\alpha\ 2p^3 - 9pq + 27r = r$
so verwandelt sich die gegebene Gl. in

$y^3 - qy - r = 0$. Setzt die angenommene Gl
$y^2 = by + z + a$, wird, wie oben gezeigt worden
diese (Setzung) in eine andere kubische verwandelt, deren
man $a = \frac{2q}{3}$ $\alpha\ b = \frac{3}{q}\left(\frac{r}{2} \pm \sqrt{\frac{r^2}{4} - \frac{q^3}{27}}\right)$ an-
nimmt. Aus dieser setze man die kurze halber

$\sqrt{\frac{r^2}{4} - \frac{q^3}{27}} = f$ $\alpha\ \frac{r}{2} \pm \sqrt{\frac{r^2}{4} - \frac{q^3}{27}} = g$

so entsteht daraus die Gl.

$$z^3 = -\frac{216 f^3 g}{q^3}, \text{ also } z = -\frac{6f}{q}\sqrt[3]{g}.$$

Nun war aber $y^2 = \frac{3qy}{q} + \frac{2q}{3} + z$ folgl.
wenn man hierin den für z gefundenen
Werth setzt, wird

$$y = \frac{3q}{2q} \pm \sqrt{\frac{9q^2}{4q^2} + \frac{2q}{3} - \frac{6f}{q}\sqrt[3]{g}}$$

daraus wird, weil $x = \frac{p}{3} + \frac{y}{3}$,

$$x = \frac{p}{3} + \frac{q}{2q} + \sqrt{\frac{9q^2}{4q^2} + \frac{2q}{27} - \frac{2f}{3q}\sqrt[3]{g}},$$

die
Wurzel der kubischen Gl. $x^3 - px^2 + qx - r = 0$, eine
Wurzel, die zwar der cardanischen Formel
vorstehenden ist, so wenigstens darin
abweicht, dass sie uns eine kubische Wurzel
ziehen entfällt, da die der cardanischen

ARC 40 792 MS. 30

2

2 Satz.

6) Es lässt sich auch beweisen, dass man aus 2, 3, 4 die ursprünglichen Glieder auf einem $\mathfrak{G}$ hinwegschaffen muss ausser den §2 angegebenen Formeln, sondern dass man auch mehr als eine Wurzel ~~von~~ brauchbar eingeführt kann. Ja es kann allen möglichen Gleichungen aufgelöst kann; aber wir ~~dass~~ (wie §5) durch diese Methode alle möglichen† auf drücken für alles $\mathfrak{G}$ gebraucht werden, will an seinem orte einmal weitläufiger ausführen. Der zur Bestätigung des obigen gesagten will ich zeigen, wie sie auf Einschaltung einer neuen Grösse für die Wurzel einer kubischen $\mathfrak{G}$ finden kann, der vollkommen mit dem Cardanischen zusammenstimmt.

† ist gegensatz von imaginäre, nebenbei

Es sei nehmlich $y^3 - qy - r = 0$

man setze $yz = z^2 + a$, so ~~verwandelt~~ verwandelt sich $\mathfrak{G}$ in $\mathfrak{H}$ in z

$$z^6 + 3az^4 - rz^3 + 3a^2z^2 + a^3 = 0$$
$$-q \qquad -qa$$

Setzt man nun in dieser $\mathfrak{H}$ die glieder in denen z^4 u z^2 vorkommen $= 0$, so wird

$a = \frac{q}{3}$, u diese $z^6 + rz^3 + \frac{q^3}{27} = 0$

oder $z = \sqrt[3]{\left(\frac{r}{2} \pm \sqrt{\frac{r^2}{4} - \frac{q^3}{27}}\right)}$, diesen

Werth von z in $yz = z^2 + \frac{q}{3}$ gesetzt

gibt $y = \sqrt[3]{\left(\frac{r}{2} \pm \sqrt{\frac{r^2}{4} - \frac{q^3}{27}}\right)} + \frac{\frac{q}{3}}{\sqrt[3]{\left(\frac{r}{2} \pm \sqrt{\frac{r^2}{4} - \frac{q^3}{27}}\right)}}$

als die Wurzel für die $\mathfrak{G}$ $y^3 - qy - r = 0$

B1

fuchs